

Draagster van de GBS-bacterie en geen risicofactoren: wel of geen antibiotica tijdens de bevalling?

U bent zwanger en een test heeft laten zien dat u de GBS-bacterie (groep-B-streptokokken) in uw vagina of darmen heeft. Deze kaart kan u en uw zorgverlener helpen om de keuze om wel of geen antibiotica tijdens de bevalling te gebruiken te bespreken. De voor- en nadelen van beide opties worden besproken.

	Geen antibiotica	Wel antibiotica
Wat is de kans dat uw pasgeboren kind een GBS-infectie krijgt als u draagster bent van de GBS-bacterie en geen risicofactoren heeft?	Ongeveer 4 van de 1000 pasgeborenen (0,4%) krijgen een GBS-infectie. Dit betekent dat 996 van de 1000 pasgeborenen (99,6%) geen GBS-infectie krijgt.	De kans op een GBS-infectie neemt af met meer dan 80%. Dit betekent dat minder dan 1 van de 1000 pasgeborenen (minder dan 0,1%) alsnog een GBS-infectie krijgt.
Welke bijwerkingen kunt u krijgen van antibiotica? En welke bijwerkingen kan uw kind krijgen?	Niet van toepassing.	U kunt overgevoelig zijn voor het antibioticum (benzylpenicilline). Daardoor kunt u de volgende bijwerkingen krijgen: <ul style="list-style-type: none"> • huiduitslag of jeuk. Dit gebeurt bij 1-10 van de 100 personen (1-10%) • ernstige allergische reactie dit gebeurt bij 1 van de 1000 tot 10.000 personen (0,01 – 0,1 %) Bij u en uw baby kunnen antibiotica invloed hebben op de samenstelling van normale bacteriën in het lichaam. De verwachting is dat de invloed klein is.
Waar kan de bevalling plaats vinden?	U kunt kiezen voor een thuis- of ziekenhuisbevalling. U wordt begeleid door uw eigen verloskundige als er geen andere medische indicatie is.	De antibiotica wordt gegeven via het infuus. Dit is thuis niet mogelijk, daarom vindt de bevalling in het ziekenhuis plaats. Uw eigen verloskundige kan u begeleiden als er geen andere medische indicatie is.
Wat gebeurt er na de bevalling?	Na de bevalling is het belangrijk dat u samen met uw zorgverleners uw kind in de gaten houdt, met name de eerste 12 uur. Dit kan thuis of in het ziekenhuis.	Na de bevalling is het belangrijk dat u samen met uw zorgverleners uw kind in de gaten houdt, met name de eerste 12 uur. Dit gebeurt in het ziekenhuis.
Kunt u borstvoeding geven als u de GBS-bacterie heeft?	Ja, direct vanaf de geboorte kunt u borstvoeding geven.	Ja, direct vanaf de geboorte kunt u borstvoeding geven.