

Beleid neonaat bij zwangere vrouw met mogelijke SARS-CoV-2 (Corona) infectie

Aanstaande moeder is asymptomatisch of heeft milde klachten

Aanstaande moeder is symptomatisch volgens de geldende casusdefinitie

Thuispartus

Poliklinische partus

Klinische partus

Moeder negatief getest

Moeder positief getest of (nog) niet getest

- Indien neonaat goed: blijft bij moeder.
- Normale opname indicaties voor de neonaat. Bij respiratoire problematiek: test overwegen.

- Indien neonaat goed: blijft bij moeder.
- Normale opname indicaties voor de neonaat. Bij respiratoire problematiek: test overwegen.

- Indien neonaat goed: blijft bij moeder in strikte isolatie.
- Normale opname indicaties voor de neonaat. Dan primair als positief beschouwen. Twee opties:
 - Optie 1:
Kind minimaal 14 dagen (is incubatietijd) als positief beschouwen. Indien geen COVID-klachten dan negatief. Dus niet testen.
 - Optie 2
Testen. Kind wordt initieel als positief beschouwd:
Dag 4. Test nasopharynx + feaces
Dag 7. Test nasopharynx + feaces
Indien alle 4 de testen negatief, dan kan de neonaat als negatief worden beschouwd. Als 1 van de 4 testen positief is dan wordt het kind definitief als positief beschouwd.
- Moeder en vader kunnen niet op afdeling dus ook niet bij kind op bezoek zolang zij positief zijn (is extreme maatregel, maar onder huidige omstandigheden het veiligst).